

P R É S E N T A T I O N D U N U M É R O

Avant-propos

Olivier WEISSENBACH
rédacteur en chef du numéro



Les patients atteints de fente labio-maxillo-palatine sont pris en charge par des équipes spécialisées accréditées. Mais le nombre de ces centres de compétence est limité et ils sont parfois éloignés de la résidence du patient. Éviter des trajets coûteux et contraignants pour des visites d'orthodontie fréquentes, est important¹. Les praticiens spécialisés en orthodontie sont parfois sollicités pour collaborer et mener à bien les étapes orthodontiques. Cependant les défis que posent un traitement de fente labio-maxillo-palatine inquiètent bon nombre d'orthodontistes. Une étude récente révèle que si 80 % des jeunes praticiens US qui sont formés au traitement des fentes sont prêt à délivrer les soins requis, moins de 50 % de leurs homologues canadiens moins entraînés sont disposés à le faire². Les auteurs concluent qu'il est nécessaire d'améliorer les connaissances des futurs orthodontistes dans ce domaine. Nous avons souhaité faire le point sur les connaissances de base nécessaires à la compréhension des thérapeutiques qui

sont mise en oeuvre pour réhabiliter la morphologie et les fonctions oro-faciales. Au cours de l'embryogénèse, l'absence de coalescence normale des bourgeons faciaux donne des fentes résiduelles susceptibles de gravement perturber les fonctions, la croissance et la morphologie. Olivier TROST et son équipe font le point sur les connaissances embryologiques fondamentales de ces anomalies de la morphogénèse. Le suivi médical peut commencer avant la naissance, quand l'échographie a révélé une fente labio-maxillo-palatine. Cette découverte ne manque pas de perturber les parents. Bruno GROLLEMUND et son équipe abordent les difficultés durables de perception et de répercussion psychologique qui nécessitent une attention particulière des soignants. Afin de permettre l'acquisition d'une morphologie faciale normale, la correction chirurgicale doit être réalisée suffisamment tôt. Cette chirurgie initiale est délicate et nécessite fréquemment des interventions d'amélioration supplémentaires. Il n'a pas encore été possible de

Adresse de correspondance :

O. WEISSENBACH,
Centre de compétence de traitement
des fentes labio-maxillo-palatines,
CHU de Nancy, Hôpital Central,
29, av. du Mal. de Lattre de Tassigny, 54000 Nancy.
olivier.weissenbach@free.fr

dégager un consensus pour un protocole thérapeutique des fentes labio-maxillo-palatines universellement admis³. Les équipes reconnues ont toutes une grande expérience de la prise en charge de ces patients et parviennent à restaurer la forme et la fonction. Nous remercions les chirurgiens, Jean-Claude TALMANT, Arnaud PICARD, Etienne SIMON et Isabelle JAMES parmi les plus éminents de ce type de reconstruction, qui nous ont exposé les principes de leurs méthodes et leurs protocoles de prise en charge. Ces connaissances sont indispensables aux orthodontistes pour comprendre les fondements d'une thérapeutique si délicate. La suite normale du traitement fait appel à des séquences d'orthopédie et d'orthodontie. L'orthodontiste de proximité n'est pas quotidiennement confronté aux défis

que posent ces patients. Pour l'aider nous proposons un «Canevas» qui situe les objectifs communs à toutes les équipes et regroupe l'ensemble des situations cliniques auxquelles l'orthodontiste peut être confronté. Dès que l'équipe accréditée a défini les objectifs orthodontiques, le praticien met en oeuvre le traitement et devient ainsi un membre important de l'équipe pluridisciplinaire. Julien GODENÈCHE et son équipe illustrent à partir de cas cliniques l'étroite collaboration entre l'orthodontiste et le chirurgien.

En vous souhaitant bonne lecture et en espérant que vous puissiez trouver dans ce numéro des réponses susceptibles de vous aider à comprendre les impératifs thérapeutique et les demandes de patients qui ont déjà un long et lourd vécu médical.

BIBLIOGRAPHIE

1. Akin JJ. Le point sur les fentes labio-alvéolo-palatines. Rev. Orthop. Dento-Faciale 2008; 42:391-402.
2. Noble J, Karaiskos N, Wiltshire Wa. Future provision of orthodontic care for patients with craniofacial anomalies and cleft lip and palate. World J Orthod 2010;11:269-72.
3. Talmant JC, Lumineau JP. Approches thérapeutiques des fentes labio-maxillo-palatines : pour une croissance faciale normale. Un protocole et des techniques au service de la ventilation nasale. Orthod Fr 2004;75:297-319.