P R É S E N T A T I O N D U N U M É R O

Avant-propos

Olivier WEISSENBACH
rédacteur en chef du numéro

Dans ce deuxième numéro consacré aux fentes labio-maxillo-palatines nous voulons poursuivre avec l'esprit de formation qui avait prévalu dans la première partie. Après avoir exposé les fondements spécifiques à leur prise en charge, nous aimerions susciter aujourd'hui la réflexion sur la complémentarité des disciplines intervenant dans l'approche thérapeutique globale.

Le suivi médical débute avant la naissance quand l'échographie révèle une anomalie faciale congénitale. Le Docteur Pascale BACH-SEGURA, radiologue spécialisée dans le suivi obstétrical à la maternité régionale de Nancy, nous expose les moyens diagnostiques et les difficultés d'annonce de ces malformations au travers de son expérience du dépistage prénatal.

L'équipe de chirurgie maxillo-faciale de l'Hôpital Trousseau (APHP) synthétise les controverses et les impératifs du traitement primaire des brèches alvéolaires avant d'exposer leurs techniques et leur calendrier. Ils insistent particulièrement sur l'importance du diagnostic, de la prise en charge individualisée, de l'évaluation et de

la reconstruction radiographique tridimensionnelle.

Dans le premier numéro de la Revue d'ODF consacré aux fentes nous avons rappelé l'importance des tissus dentaires dans la morphologie, la croissance et la thérapeutique. Olivier MATERN *et al.* nous rappellent la fréquence élevée des anomalies dentaires en nombre et en forme chez les patients porteurs de fente. Cet article propose une hypothèse originale qui lie la pathogénie des agénésies dentaires à celle des fentes.

La réhabilitation prothétique de l'occlusion est fréquemment nécessaire. Souvent la restauration est complémentaire à l'orthodontie. L'équipe de chirurgie maxillo-faciale de l'Hôpital Central (CHU Nancy)

Adresse de correspondance :

O. WEISSENBACH,
Centre de compétence de traitement
des fentes labio-maxillo-palatines,
CHU de Nancy, Hôpital Central,
29, av. du Mal. de Lattre de Tassigny, 54000 Nancy.
olivier.weissenbach@free.fr

traite de la problématique avec de nombreux exemples. La grande variabilité des caractères cliniques explique qu'il est difficile de réaliser un protocole standard, que la réhabilitation peut être plus ou moins complexe et qu'en termes techniques il n'y a pas de spécificité.

Jean-François BARON, chirurgien maxillo-facial, montre l'importance de la prise en charge initiale. Grâce à son expérience insulaire exceptionnelle, il constate que même si les principales séquelles anatomiques sont secondaires aux brides cicatricielles chirurgicales, l'absence de traitement primaire entraîne des répercussions fonctionnelles et morphologiques très importantes qui handicapent l'intégration scolaire et sociale. Il n'existe pas de moyen idéal pour parvenir à un résultat espéré, car la réalité clinique est souvent différente des conceptions théoriques. Il

faut intégrer dans la prise en charge des fentes le patient avec son entourage familial, culturel et médical.

Dans le passé le «monde orthodontique» a été influencé par des écoles ou des philosophies. Les dogmes guidaient le choix des thérapeutiques. La formation universitaire moderne a émancipé l'orthodontie des différentes doctrines. Michel AMORIC nous rappelle l'importance d'une méthode médicale rigoureuse pour le progrès. Le traitement des fentes labio-maxillo-palatines n'échappe pas à cette règle.

À propos d'une décision du 22 mars 2012 de la Cour de cassation portant sur l'obligation de contention et de suivi, Alain BÉRY commente les différents jugements ayant abouti à cet arrêt et s'interroge sur les éventuelles répercussions pour l'orthodontiste.

En vous souhaitant une agréable lecture, j'espère avec le comité de rédaction que les deux numéros de la Revue d'Orthopédie Dento-Faciale consacrés aux fentes vous ont permis d'approfondir vos connaissances et peut-être de lever vos appréhensions et inhibitions face à ces cas difficiles.